

## DERNEK

yani  $x = 12$  elde edilir.

II)  $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$  denkleminin kökleri  $x$  yerine  $y - \frac{b}{3}$  yazılırsa,  $y$ 'ye göre

$$y^3 + py + q = 0$$

kübik denklemi elde edilir.  $y$  ye göre olan kübik denkleminin kökleri  $y_k$  ( $k = 1, 2, 3$ ) ise, verilen denklemin  $x_k$  kökleri,  $x_k = y_k - \frac{b}{3}$  bağıntısından bulunur.

**Örnek.**  $x^3 + 9x^2 + 3x - 117 = 0$  denkleminin bir kökünü bulalım.

$$x = y - \frac{b}{3} = y - 3 \quad \text{için} \quad y^3 - 24y - 72 = 0$$

elde edilir.  $p = -3ab = -24$ ,  $q = -ab(a + b) = -72$  den  $a = 8$ ,  $b = 1$  (veya  $a = 1$ ,  $b = 8$ ) ve

$$\frac{(y + 8)^3}{(y + 1)^3} = 8 \Rightarrow y = 6$$

köku bulunur. Verilen denklemin bir kökü

$$x = y - 3 = 3 \quad \text{tür.}$$

## KAYNAKÇA

- [1] Y.Avcı ve N.Ergun, Polinom kökleri için bir algoritma, Matematik Dünyası, 6. sayı 1, 19-21 (1996).
- [2] N.Çalışkan, Cebirsel Denklemlerin Kökleri, Matematik Dünyası, 4. sayı 3, 9-13 (1994).
- [3] G.Tischel und H.Uchtmann, Analysis, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main (1973).

## YARIŞMA PROBLEMİ Y.119'UN YANITINDA DÜZELTME

Ataşağın Baykal

**Y.119.** Eksen uzunlukları  $2a$  ve  $2b$  olan bir elipsin herhangi bir noktasından çizilen normalin elips içinde kalan kısmının uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

*Subat 1996 sayımızda verdiğimiz yanıtta bir hesap hatası sonucunda en küçük ve en büyük değerlerin eksen uzunlukları  $2a$  ve  $2b$  olduğu çıkarılmıştı. Problem köşemizin en faal çözücülerinden Sayın Ataşağın Baykal hatamızı belirleyip doğru yanıtı bize gönderdi. Kendisini kutlar ve teşekkür ederiz.*

Y.119'un çözümünde elipsin büyük eksen uzunluğu  $2b$ , küçük ekseninki ise  $2a$  olarak alınmış. Elipsin üzerindeki bir noktanın apsisi  $x_0$  ise  $x_0^2 = t$  denilerek, aranan uzunluk için

$d^2 = f(t) = \frac{4b^2(Gt+a^4)^3}{[(a^2+b^2)Gt+a^6]^2}$  fonksiyonu elde edilmiş.

Bu fonksiyonun türevi alınırken yanlışlık yapılmış.

$f'(t) = \frac{4b^2G(Gt+a^4)^2[(a^2+b^2)Gt+a^6]-2a^4b^2}{[(a^2+b^2)Gt+a^6]^3}$  olacaktı.

Böyle olunca da problemin çözümü bağlamında söylenenlerin, artık şöyle olması gerekirdi:

Ekstrem noktaları bulacağımıza göre  $f'(t) = 0$  olmalı.  $(a^2 + b^2)Gt + a^6 - 2a^4b^2 = 0$  veya  $Gt + a^4 = 0$  dan  $t_1 = \frac{a^4(2b^2 - a^2)}{(a^2 + b^2)G}$ ,  $t_2 = -\frac{a^4}{G}$   $t = x_0^2$  olduğuna göre negatif olan  $t_2$  sorumuzu yanıtlamaz. O halde  $G = b^2 - a^2$  olduğunu göz önüne alırsak  $t_1 = \frac{a^4(2b^2 - a^2)}{b^4 - a^4}$  olan noktada fonksiyonun minimumu vardır. Çünkü türevdeki birinci çarpan  $(Gt + a^4)^2 > 0$ , ikinci çarpan  $(a^2 + b^2)Gt + a^6 - 2a^4b^2$  ise  $t < t_1$  iken negatif ve  $t > t_1$  iken pozitif olduğu için  $f'(t)$ ,  $t = t_1$  olan noktada negatiften pozite geçiyor. Ne var ki  $|x_0| \leq a$  olduğundan

$$x_1^2 = t_1 = \frac{a^4(2b^2 - a^2)}{b^4 - a^4} \leq a \quad \text{olmalıdır.}$$

$a^4(2b^2 - a^2) \leq a^2(b^4 - a^4)$ , yani  $b \geq \sqrt{2} \cdot a$  istenen aralıkta olmalıdır.

Demek ancak  $b \geq \sqrt{2}a$  iken türev sıfır olabiliyor ve  $x_1 = \sqrt{t_1}$  noktasında fonksiyon mini-