

## SONSUZLUĞUN OLAĞANÜSTÜ ÖZELLİKLERİ

Timur Karaçay


Çağdaş matematiğin tümüyle *sonsuzluk* kavramından doğduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 20. yy başlarına kadar, matematiği *ilkel (elementary) matematik* ve *yüksek matematik* diye ikiye ayırırlardı. İlkel matematik, toplama, çıkarma, bölme işlemleriyle; yani dört işlemle yapılan matematik idi. Yüksek matematik ise, dört işlemle ek olarak *limit* işleminin de kullanılmasıyla yapılan matematik idi. Bugün, bu tür bir sınıflandırma çok yetersiz kalır. Ama, limit işleminin beşinci işlem olarak matematiğe girişi, matematiğin ilgi alanını çok büyütmele kalmamış, pek çok fiziksel probleme de çözüm getirmiştir. Çağdaş bilim ve teknolojinin ürünleri varlıklarını tamamıyla limit kavramına borçludurlar. Matematikte limit kavramının doğuşu *sonsuz* kavramına dayanır. *Sonsuz büyükler* ve *sonsuz küçükler* diye adlandırılan kavramlar fiziksel olaylarla da ilişkilidir. Bir niceliğin sınırsız olarak büyümesi ya da küçülmesi doğa olaylarında sık karşılaşılan bir olgudur.

Eski çağlarda düşünürler sonsuz kavramını ele almışlardır. Zaten saymayı öğrenen her insan, her doğal sayının bir ardılı olduğunu kolayca sezmekteydi. Başka bir deyişle, sayma eylemi için kullandığı sayı kümesinin (*doğal sayılar*) en büyük ögesi yoktu. Çünkü en büyük doğal sayı var olsaydı, o sayıya 1 sayısı eklendiğinde daha büyük bir doğal sayı elde edilecekti. Yani bu sayı kümesi her sınırı aşıyor, sonsuza ulaşıyordu. Öyleyse, basit sayma işlemini yapan herkes sonsuzluk kavramı ile ister istemez karşılaşacaktı.

Ne var ki, eski zamanlarda matematiksel bilgiler sonsuzluğu içeren düşünceleri çözüme ulaştırarak düzeye ulaşmamıştı. O nedenle, sonsuzluğu içeren kimi düşünceler birer çatışkı (paradoks) yaratıyordu. Bu çatışkılar arasında ilginç bulacağınız bazılarını bu sayfada açıklamayı sürdüreceğiz.

### Zeno Çatışkısı

M.Ö. 490-435 yılları arasında yaşayan Eski Yunan düşünürü Zeno hızlı bir koşucunun bir kaplumbağaya yetişemeyeceği savını ortaya attı. Zeno şöyle diyordu: Koşucu bir  $A$  noktasında, kaplumbağa bir  $B$  noktasında iken yarış başlamış olsun. Bu konumda, aralarında bir  $|AB|$  uzaklığı vardır. Bu uzaklık sifıra eşit değildir. Kaplumbağa ne kadar yavaş, koşucu ne kadar hızlı giderse gitsin, koşucu  $B$  noktasına ulaştığında, kaplumbağa bir  $B_1$  noktasına ulaşacaktır.  $A_1 = B$  diyelim.



Yeni konumlarıyla, koşucu  $A_1$ , kaplumbağa  $B_1$  noktasındadır. Aralarında  $|A_1B_1|$  uzaklığı vardır. Bu uzaklık da sifır değildir. Dolayısıyla bu konum ilk konumlarına benzemektedir: Koşucu  $A_1$  noktasından  $B_1$  noktasına erişene dek, kaplumbağa bir  $B_2$  noktasına erişecektir.  $A_2 = B_1$  diyelim. Gene  $|A_2B_2|$  uzaklığı sifır olmadığından, bu yeni konumları da ilk konumlarına benzemektedir. Bu olgu  $3., 4., 5., \dots, n, \dots$  konumlarda da aynı olacaktır.  $n$  düşünebildiğiniz kadar büyük bir doğal

sayı olsun.  $n$  inci konumda, koşucu ile kaplumbağa arasında sifira eşit olmayan  $|A_n B_n|$  uzaklığı var olacaktır. Her  $n$  sayısı için benzer konumlar olduğuna göre, koşucu, kaplumbağaya hiçbir zaman yetişemez.

Zeno'nun düşüncesini kavrayabildiğimiz an ona hak veriyoruz; doğru düşündüğünü görüyoruz. Hatta bu çatışkıyı kullanarak hareketen olmadığı sonucuna bile ulaşabiliriz. Zeno'ya göre, atılan bir ok hedefine varamaz. Çünkü hedefe ulaşabilmesi için, önce ilk yarı yolu geçmesi gerekir. İlk yarışı geçebilmesi için onun da ilk yarısını geçmesi gerekir. İlk yarının yarısını geçebilmesi için onun da ilk yarısını geçebilmesi gerekir... Bu süreç sonsuz olarak yineleneneğine göre, atılan ok hedefe ulaşamaz.

Öte yandan, gerçek yaşamda bir koşucunun bir kaplumbağayı geçebileceğini gözlerimizle görüyoruz... Hedefine varamaz diye hiçbirimiz bir okun önüne durmayız...

Zeno'nun ortaya koyduğu mantık ile, gerçek arasındaki bu ayrım yüzyıllar boyunca çözülemeyen bir çatışkı (*paradoks*) olarak kaldı.

Bunun çözümü için 1000 yıldan fazla bir zamanın geçmesi gerekti. Matematik sonsuz serilerin yakınsaklığı kavramını ortaya koyduktan sonra Zeno'nun çatışkısı kolayca çözüme ulaştı. Şimdi bu kolay çözümü vereceğiz:

Koşucunun  $A$  noktasından  $A_1$  noktasına ulaşması için geçen zaman  $t_0$ ,  $A_1$  noktasından  $A_2$  noktasına ulaşması için geçen zaman  $t_1$ ,  $A_2$  noktasından  $A_3$  noktasına ulaşması için geçen zaman  $t_2, \dots, A_n$  noktasından  $A_{n+1}$  noktasına ulaşması için geçen zaman  $t_n, \dots$  olsun. Bütün bu zamanların toplamı

$$\sum_{n=0}^{\infty} t_n$$

olacaktır. Örneğin, kaplumbağanın hızını epeyce abartılı seçelim: Koşucunun aralarında 10 m. uzaklık olduğunu kabul edelim. Bu durumda, her

$n$  için  $t_n = 1/2^{n+1}$  olacaktır. Dolayısıyla,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 1$$

olacaktır. Yani koşucu 1 saniyede kaplumbağaya yetişecektir. Benzer yöntemle bir okun hedefine varacağını kanıtlayınız.

"Matematğin anlamı ya da doğa bilimleri ile ilişkisi anlatılmadan çirkin bir odaya cebirsel toplamalar yapmak üzere kapatılmak birçok yazarda olduğu gibi benim de yaşamım boyunca matematikten nefret etmeme neden oldu."

G.B.Shaw

6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1

## MODÜLER ARİTMETİKLE AYLARIN GÜN SAYISI

Hangi ayın kaç gün çekeceğini veren basit bir kural bilmiyoruz. Ancak,  $n$  ve  $r$  ay numaraları olduğuna göre

$$5n + 1 = r \pmod{12}$$

eşitliğinde sırasıyla 1,2,...,12 değerlerini verip  $r$  için elde ettiğimiz değerleri soldan sağa doğru yazdığımızda, şubat ayının solunda kalan ayların 30 günlük aylar; sağında kalanların ise 31 günlük aylar olduğunu görürüz. (*Hüseyin Demir*)